

第三章 水災新聞採訪



照片由易仰民先生提供

萬全準備（見第一章）

尤須注意預防因不潔水源造成的疾病，例如腹瀉和痢疾等，食物和食水必須小心處理。

裝備

1) 文字記者

必須裝備：

- 運動鞋或行山鞋：
 - ✗ 不要選擇鞋面防水的，否則，鞋子入水後會變成「水桶」；
 - ✓ 鞋筒要高於腳眼，既可護腳，以免扭傷，更可避免山泥或水「啜」腳，甚至步行時，整隻鞋被吸在泥底或水底；
 - ✓ 適宜選擇鞋底有深度「坑紋」的，以減少滑倒的機會；
- 保護性衣物：
 - i) 救生衣：坐艇到水淹地區時用，可考慮抵埗後購買；
 - ii) 口罩：預防細菌，尤其是後期，因為水浸腐屍後可能出現疫情；
- 衛星電話：在一般通訊器材失效時使用
- 手提電話：往內地採訪時最好是用裝置一咭兩用的手機，這可令通話費較便宜之餘及更可方便與內地人士保持聯絡；如有可能，請在當地購買一種名為「小靈通」的個人通信接入系統，這是一種把手機與固網電話連接的系統，故此通話費較便宜且訊號穩定(但若通

- 話時高速行進，訊號會很不穩定，甚至無法通話)；
- 電腦：連配件、充電器、萬能插蘇等
 - ✓ 最好附有網上通訊軟件，例如Skype；
 - ✓ 出發前緊記檢查傳送資料的軟件能否正常運作；
 - 掌上電腦(PDA)：既可通話，又可在沒有電腦的情況下傳送相片；
 - 數碼照相機：由於人手所限，攝影記者有時會與文字記者分途採訪，文字記者應帶備照相機以備不時之需；並須帶備至少兩張記憶卡替用；
 - 雨衣：水災後仍然有可能降大雨。若來不及購置，可在便利店購買數元一件的簡單雨衣，用後即棄。

建議裝備：(在不影響輕裝上路的情況下帶備)

- 防止痾嘔藥物：水災災區的食水易受污染，一不小心，便會上吐下瀉；
- 淨水丸：每一公升水要一粒淨水丸。出發時才購買，以免因貯存太久而過期；
- 樽裝水：抵埗後購買；
- 若當地衛生條件甚差，以致不能確保現煮食物的安全，可購買罐頭或預先包裝食品；
- 濕紙巾：最好是帶酒精成份的，可供消毒；
- 大量可以密封物品的食物袋或膠袋，以保護重要物品跌入水中或下大雨時亦不致被弄濕；
- 指南針；
- 收音錄音兩用機：除錄音工作外，收音機可讓你隨時收聽當地電台，了解最新資訊；

- 防水外套：Gore-tex或Aquatex製造的衣服，既可透氣，又可防水；
- 補充體力食品：如Energy Bar(這可在抵埗後購買)；
- 薑茶沖劑：既可驅寒，亦可輕微紓緩「暈船浪」或嘔吐後的不適感覺；
- 記者標誌：標明是記者的臂章或輕便夾衣(使用時須要審時度勢，要在記者工作受尊重的環境下才使用)；

2) 攝影記者

除上述記者裝備外，還須帶備下列物資：

- 攝影器材：兩部機身加所須鏡頭、閃光燈、記憶卡(數量視乎工作天數而定，一星期的工作，5支枝應已足夠)
- 衛星數據器：功能與衛星電話相若，但可傳送照片，與附有通訊軟件的電腦連接，更可作衛星電話用
- 掌上電腦(PDA)：若帶備電腦及衛星數據器，可以毋須攜帶掌上電腦
- CDMA咭：上網用
- 接駁汽車充電器：約150W即可(可供驅動手提電腦和替其他電器充電用)
- 縮骨雨傘：保護照相機之用。不建議用照相機雨衣，因不便四處走動工作



▲替速記本穿繩，便可掛在頸上，方便書寫。

- 照相機防濕用品：例如相機罩，但這會影響拍照的靈活度，記者要自行評估是否使用。
- 強力小電筒

3) 電子傳媒

除拍攝器材外，攝影師、工程人員的個人裝備，以至傳送資訊的電腦器材，大致與攝影記者相近，請參考。不過，帶傘的建議未必適用於電視台攝影師，因為攝影師要雙手操作器材，即使在下雨天工作亦不宜打傘。

須要多帶一套消毒液體為攝影器材消毒。

由於電視台不時要做直播，要長時間與台方通話，有工程人員介紹，可購置一條USB連手機充電線，以便使用電腦時同時為手提電話充電，毋須另外找尋電源。

在地工作注意事項

- ✗ 不要妨礙救援人員的工作
- ✗ 不見水底，不要赤腳，否則可能會被尖物刺傷腳部
- ✗ 不要穿水鞋，因水鞋很易磨損腳部
- ✗ 不要穿涼鞋，因為鞋子很容易甩掉，尤其是在水中步行時
- ✗ 不要穿濕襪，否則容易磨損腳，而皮膚浸泡後，亦較易受感染(可考慮隨身帶備一對襪子作替換)
- ✗ 不要坐出租電單車，這些車的安全程度總不及汽車，「鐵包骨」總比「骨包鐵」好
- ✗ 不要抄小路到目的地
- ✗ 最好不要一人單獨採訪：兩人互相照應，較為安全
- ✓ 小心漏電

- ✓ 小心水災導致喉管破裂，以致出現氣體洩漏
- ✓ 請體諒死傷者家屬，不要在他們的傷口上撒鹽，例如少用閃光燈拍照或避免不客氣地提問
- ✓ 身體皮膚無損是抵禦細菌入侵的最佳屏障，若有任何磨損、傷口及蚊叮蟲咬，應立刻塗抹具殺菌功能的軟膏，並蓋以紗布。總之，小傷口或輕微皮膚損傷都要積極處理，建議定時塗抹碘
- ✓ 被老鼠尿液污染的水接觸皮膚，可以令人患上鉤端螺旋體病；
- ✓ 若水源缺乏，請留意以下用水原則：
 - ◆ 頻密而小口地飲水，比一次過地長飲更好；
 - ◆ 除非肯定再有水供應，否則不應把手頭上的水飲乾用淨；
 - ◆ 無論是晚間前行或日間靜止不動，成年人每天最少要補充一加侖(即4.5升)水。